

# えだまめ (普通)

## 品種

**サッポロミドリ(緑豆)**：早生品種で85日～90日で収穫でき、露地向きで草丈が短く、多収です。

**味太郎(茶豆)**：早生品種で、80日前後で収穫できます。茶豆独特の香り、食味に優れています。地力のある圃場で植えてください。

**たんくろう(黒豆)**：早生品種で80日～85日で収穫でき、草丈は70cmと大きくなります。




## 作型の例 ( ◆ — は種 ● — 収穫 )

月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
早生直まき	◆ — ◆				● — ●	

## 施肥例

(kg/a)

肥料の種類	基肥	追肥	
たかおか堆肥	200		
苦土石灰	12		
硝加磷安333	1		
やさい磷加安S540		2	2



エダマメの品質は追肥の影響が大きく、必ず行うようにしてください。  
開花始めからその10日後までに追肥すると、糖、アミノ酸含量が向上する。  
収穫10日前～15日前に追肥すると、莢色の向上、アミノ酸の低下が押さえられる。  
エダマメは排水の良い圃場を好むため排水対策はきっちり行いましょう。  
収穫適期は非常に短い為、取り遅れには注意してください。

## 栽培の特徴とポイント

生育適温は25℃～30℃で地温は12℃以上が必要です。収穫適期は短いので採り遅れに注意しましょう。