

農薬の登録が変更になります

平成28年11月30日に登録内容が変更されます。使用の際はご注意ください。

【対象農薬】

コテツフロアブル (有効成分「クロルフェナピル」を含む農薬)

★ 該当作物の変更に前 ★

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の使用回数
非結球レタス	ハモンヨトウ、オオタバコガ、ナメグリバエ、ヨトウムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
バナナ	バナナツヤオゾウムシ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで			
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ミカンキイロアザミウマ、ブドウサビダニ ナミハダニ、カンザワハダニ、ハモンヨトウ、トビイロトラガ、モンキクロノメカ、ミノカ類、コガネムシ類						
ブロッコリー	コガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで			
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、ひろしまなを除く)	コガ			収穫3日前まで	1回	1回	
しゅんぎく	ハモンヨトウ			収穫前日まで	2回以内	2回以内	



★ 該当作物の変更に後 ★

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の使用回数
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ミカンキイロアザミウマ、ブドウサビダニ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ナミハダニ、カンザワハダニ、ハモンヨトウ、トビイロトラガ、モンキクロノメカ、ミノカ類、コガネムシ類						
ブロッコリー	コガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	1回		
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、ひろしまな、チンゲンサイ、さんとうさいを除く)	コガ			収穫14日前まで			
チンゲンサイ				収穫7日前まで			
さんとうさい				収穫3日前まで			
しゅんぎく	ハモンヨトウ			収穫14日まで	2回以内	2回以内	