

令和4年産 大豆栽培記録

◎栽培記録の記帳及び農業生産工程管理(GAP)の徹底を図り、口高品質で安全・安心な富山県産大豆を生産しましょう。

住 所		電話番号	
生産者名・組織名		代表者氏名	

品 種 名	えんれいのそら・シュレイ	栽培面積	a
-------	--------------	------	---

指導員確認欄
月 日

排水対策	心土破砕	月 日 ~ 月 日	額縁排水溝	月 日 ~ 月 日
は 種	は種日	月 日 ~ 月 日	は種量	kg/10a

区 分		肥 料 名	使 用 月 日	施用量
土づくり	有機質資材	発酵鶏糞	月 日 ~ 月 日	kg/10a
	土壌改良資材	苦土石灰	月 日 ~ 月 日	kg/10a
				月 日 ~ 月 日
施 肥	基 肥	BB084・たかおか12号	月 日 ~ 月 日	kg/10a
			月 日 ~ 月 日	kg/10a

農 薬 名		摘 要	使 用 月 日	使用量
種子消毒	一発処理	クルーサー MAXX	月 日 ~ 月 日	8 ml/種子1kg
	塗沫	クルーサー FS 30	月 日 ~ 月 日	6 ml/種子1kg
		キヒゲン R-2 フロアブル	月 日 ~ 月 日	20 ml/種子1kg
	粉衣	キヒゲン	月 日 ~ 月 日	乾燥種子の1%
			月 日 ~ 月 日	

農 薬 名		散布時期・散布量	使 用 月 日	使用量	
雑草防除	粒 剤	トレフナサイト [®] 粒剤	月 日 ~ 月 日	kg/10a	
		ラクサー 粒剤	月 日 ~ 月 日	kg/10a	
			月 日 ~ 月 日	kg/10a	
	乳 剤 ・ 乳 剤	大豆バサグラン液剤	2葉期～開花前 (100~150ml/水100l) 雑草茎葉散布	月 日 ~ 月 日	ml/10a
			2葉期～開花前 (300~500ml/水100l) 畝間雑草茎葉散布	月 日 ~ 月 日	ml/10a
		ホルトフロアブル	イネ科雑草3~10葉期 (200~300ml/水100l) 雑草茎葉散布	月 日 ~ 月 日	ml/10a
		ラウンドアップマックスロード [®]	畝間雑草 (200~500ml/水100l) 畝間処理	月 日 ~ 月 日	ml/10a
		エコトップP 乳剤	播種直後 (400~600ml/水100l)	月 日 ~ 月 日	ml/10a
		バスタ液剤	畝間雑草 (300~500ml/水100~150l) 畝間処理	月 日 ~ 月 日	ml/10a

培土	1回目	月 日 ~ 月 日	2回目	月 日 ~ 月 日	3回目	月 日 ~ 月 日
----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

畝間かん水	月 日 ~ 月 日	月 日 ~ 月 日	月 日 ~ 月 日	月 日 ~ 月 日
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

薬名		対象病害虫	使用月日	使用量	
粉 剤	基本	スミチオンベルコート 粉剤 DL	マメシクイガ、カメムシ類 等	月 日 ~ 月 日	kg/10a
		マネジトレボン 粉剤 DL	紫斑病、カメムシ類 等	月 日 ~ 月 日	kg/10a
	随時	ダントツ H 粉剤 DL	フタスジヒメハムシ類 等	月 日 ~ 月 日	kg/10a
		トレボン 粉剤 DL	ハスモンヨトウ、カメムシ類 等	月 日 ~ 月 日	kg/10a
液 剤		ベルコートフロアブル 1000倍液	紫斑病、ハスモンヨトウ、カメムシ類	月 日 ~ 月 日	倍液 0
		スミチオン 乳剤 1000倍液		月 日 ~ 月 日	倍液 0
		アミスタートレボン SE	紫斑病、カメムシ類	月 日 ~ 月 日	倍液 0
				月 日 ~ 月 日	倍液 0
ラジ ヘリ	委託先		使用月日	使用量	
		・ JA	・その他()	月 日 ~ 月 日	
				月 日 ~ 月 日	倍液 0
				月 日 ~ 月 日	倍液 0
随時			月 日 ~ 月 日	/10a	
			月 日 ~ 月 日	/10a	

※ 上記以外の資材を使用した場合は、空欄に記入願います。

収穫期	刈取予定日	月 日 ~ 月 日	乾燥調製	・JA施設	・その他()
-----	-------	-----------	------	-------	---------